**Analyse combinatoire
Probabilités**

Variables aléatoires

Couples aléatoires

Génération de nombres aléatoires

Introduction aux statistiques

unité: MA3R11

Références bibliographiques

- ◆ Cours basé sur 2 ouvrages:
 - ◆ « Initiation aux probabilités » de Sheldon M. Ross,
Ed : Presses polytechniques romandes
 - ◆ « Probabilités pour scientifiques et ingénieurs » de Patrick Bogaert,
Ed: de boeck

Analyse combinatoire

3 - Probabilités, Pascale Jardin

◆ Introduction par un exemple :

- ◆ On considère un système de communications composé de n antennes identiques alignées. Ce système n'est fonctionnel que s'il n'y a pas 2 antennes consécutives défectueuses. On suppose qu'il y a m antennes défectueuses. Quelle est la probabilité pour que le système reste fonctionnel?
- ◆ Solution (graphique) pour $n=4$, $m=2$: $p=1/2$

Principe fondamental de dénombrement

- ◆ Si r expériences à réaliser avec :
 - ◆ n_1 résultats possibles pour la 1^{ère}
 - ◆ n_2 résultats possibles pour la 2^{ème}
 - ◆ ...
 - ◆ n_r résultats possibles pour la $r^{\text{ème}}$
- ◆ Alors il y a $n_1 n_2 \dots n_r$ résultats possibles pour les r expériences prises ensemble

Exercice 1: nombre de plaques minéralogiques dans un département si le matricule comporte 4 chiffres et 3 lettres (en plus des 2 chiffres du département)

Exercice 2: combien de fonctions sur n points à deux valeurs possibles par point?

Permutations

- ◆ Théorème: le nombre de permutations de n objets distinguables est $n!$
- ◆ Théorème: le nombre de permutations de n objets parmi lesquels n_1 sont indistinguables, n_2 autres également, ..., n_r autres également est: $n!/(n_1! n_2! \dots n_r!)$
 - ◆ Exemple: pepper : $6!/(3!2!)$ permutations

Arrangements - Combinaisons

- ◆ $n(n-1)\dots(n-r+1) = n!/(n-r)!$ représente le nombre de manières de choisir r objets parmi n . C'est le nombre d'arrangements de r objets parmi n noté A_n^r
- ◆ Ce nombre comporte toutes les permutations des r objets choisis. Si l'ordre des r objets n'a pas d'importance il faut diviser ce nombre par $r!$
- ◆ $n(n-1)\dots(n-r+1)/r! = n!/(r!(n-r)!)$ représente le nombre de combinaisons de r objets parmi n et est noté C_n^r

Exercice des n antennes

◆ Identité remarquable

$$C_n^r = C_{n-1}^{r-1} + C_{n-1}^r \quad 1 \leq r < n$$

11

121

1331 triangle de Pascal

14641

....

◆ Théorème du binôme

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}$$

Exercice : démontrer l'identité remarquable

Exercice : démontrer le théorème du binôme par récurrence

Exercice: combien y a-t-il de sous ensembles d'un ensemble à n éléments?

Coefficients multinomiaux

- ◆ Problème: un ensemble de n objets distincts doit être divisé en r groupes de tailles respectives $n_1, n_2, \dots, n_r$ (avec $n_1 + \dots + n_r = n$). De combien de manières peut on le faire?

$$C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} \dots C_{n-n_1-n_2-\dots-n_{r-1}}^{n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

- ◆ Ce nombre est appelé coefficient multinomial et noté : $C_n^{n_1, n_2, \dots, n_r}$
- ◆ Théorème multinomial :

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{(n_1, n_2, \dots, n_r) : n_1 + \dots + n_r = n} C_n^{n_1, n_2, \dots, n_r} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r}$$

- ◆ Combien de termes dans la somme?
Combien de solutions entières ≥ 0 telles que $n_1+n_2+\dots+n_r=n$
- ◆ Étape: solutions >0 : il faut choisir $r-1$ séparateurs parmi $n-1$ possibles : C_{n-1}^{r-1}
- ◆ Solutions ≥ 0 :
même nombre que solutions >0 de:
 $n'_1+n'_2+\dots+n'_r=n+r$ c'est-à-dire : C_{n+r-1}^{r-1}

Exercice: retour au problèmes des antennes: n antennes dont m défectueuses:

On aligne d'abord les m antennes défectueuses

n_1 antennes Ok à gauche de la 1^{ère} défectueuse

n_2 antennes Ok à droite de la 1^{ère} défectueuse et gauche de la 2^{ème} défectueuse

...

n_{m+1} à droite de la $m^{\text{ème}}$ défectueuse

Il faut $n_i > 0$ pour $i = 2$ à m , $n_1 \geq 0$, $n_{m+1} \geq 0$ pour que le système fonctionne:

nombre de cas : sol >0 de $n'_1+n'_2+\dots+n'_m+n'_{m+1}=n-m+2$: C_{n-m+1}^m

Axiomes des probabilités

11 - Probabilités, Pascale Jardin

Ensemble fondamental - évènement

- ◆ Ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire : c'est l'ensemble fondamental noté Ω
 - ◆ Ex: expérience = jeter 2 pièces
 $\Omega = \{(P,P), (P,F), (F,P), (F,F)\}$
- ◆ Tout sous ensemble de Ω est un évènement:
 - ◆ $A \subset \Omega$ est un évènement
 - ◆ $\omega \in \Omega$ est un résultat possible ou évènement élémentaire
 - ◆ Ex: la première pièce montre pile
 $A = \{(P,P), (P,F)\}$

Relations entre évènements

- ◆ Manière la plus simple de les représenter : diagrammes de Venn

- ◆ $A \subset B$ (exemple d'inclusion)
 - ◆ $\Rightarrow A \cap B = A$
- ◆ $A \cap C = \emptyset$ (définition de l'incompatibilité)

Complémentarité: l'évènement complémentaire d'un évènement A est l'évènement A^c tel que:

$$-A \cap A^c = \emptyset$$

$$-A \cup A^c = \Omega$$

Propriétés des opérations sur les évènements

◆ Commutativité

- ◆ $E \cap F = F \cap E$

- ◆ $E \cup F = F \cup E$

◆ Associativité

- ◆ $(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G)$

- ◆ $(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G)$

◆ Distributivité

- ◆ $(E \cap F) \cup G = (E \cup G) \cap (F \cup G)$

- ◆ $(E \cup F) \cap G = (E \cap G) \cup (F \cap G)$

◆ Lois de Morgan

- ◆ $(\cup_i E_i)^c = \cap_i E_i^c$

- ◆ $(\cap_i E_i)^c = \cup_i E_i^c$

On peut montrer ces propriétés par des diagrammes de Venn

Systeme complet d'événements ou partition

- ◆ Former une partition de Ω consiste à « couper » l'ensemble Ω en événements incompatibles: à l'issue de l'expérience un et un seul de ces événements sera réalisé

- ◆ Définition formelle : L'ensemble $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ est une partition de Ω si et seulement si:
 - ◆ Aucun des événements n'est impossible: $A_i \neq \emptyset \quad \forall i$
 - ◆ Les événements sont incompatibles 2 à 2: $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$
 - ◆ L'union des événements est l'ensemble fondamental: $(\cup_i A_i) = \Omega$

Probabilité d'un évènement

- ◆ Approche intuitive (définition en fréquence): on réalise n fois l'expérience sous les mêmes conditions. Pour chaque évènement A de Ω on définit $n(A)$ comme le nombre de fois où A survient. Alors la probabilité de A est définie par:
 - ◆ $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(A)/n$: fréquence limite de A
 - ◆ Exemple : lancé de dé avec $A = \text{« on obtient 6 »}$

- ◆ Problème théorique : la limite existe-t-elle ?
- ◆ Problème pratique : réaliser un très grand nombre de fois l'expérience

« Expériences » avec Matlab

- ◆ Nombreux « tutoriels » matlab disponibles sur internet
 - ◆ Un « maison » :
http://intra.esiee.fr/sigtel/intro_matlab.pdf
 - ◆ D'autres
 - ◆ <https://moodle.polymtl.ca/file.php/408/GuideMatlab.pdf>
 - ◆ <http://www.ann.jussieu.fr/~postel/matlab/>
 - ◆ <http://www.ann.jussieu.fr/~joly/mattex/Matlab1.pdf>
 - ◆ <http://www.civil.usherbrooke.ca/cours/gci101/Hiver%202010/Matlab/Tutoriel%201%20Matlab.pdf>
- ◆ Je signale en fin de certaines pages de commentaires ([exp matlab](#)) les commandes matlab qui permettent de réaliser des expériences associées aux différents éléments du cours.
- ◆ Pour avoir une aide sur une commande faire:
help nom_de_la_commande

Définition axiomatique

- ◆ La probabilité est un nombre satisfaisant les 3 axiomes de base suivants:
 - ◆ La probabilité d'un évènement A quelconque est positive ou nulle : $P(A) \geq 0$
 - ◆ La probabilité de l'évènement certain Ω est égale à 1: $P(\Omega)=1$
 - ◆ Si deux évènements A et B sont incompatibles , la probabilité de leur union est égale à la somme de leur probabilité: $P(A \cup B) = P(A)+P(B)$ si $A \cap B = \emptyset$

- ◆ Propriétés qui découlent de cette définition:
 - ◆ La probabilité de l'évènement impossible $\emptyset$ est égale à 0 : $P(\emptyset)=0$
 - ◆ La probabilité est un nombre inférieur ou égal à 1: $P(A)\leq 1$
 - ◆ La probabilité de l'évènement complémentaire est égale à 1 moins la probabilité de l'évènement: $P(A^c)=1-P(A)$
 - ◆ La probabilité de l'union d'un nombre quelconque d'évènements incompatibles deux à deux est égale à la somme de leur probabilité: $P(\cup_i A_i)=\sum_i P(A_i)$ si $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$
- ◆ La probabilité de l'union de deux évènements est égale à la somme de leur probabilité moins la probabilité de leur intersection:
 - ◆ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- ◆ Généralisation:
 - ◆
$$\frac{P(\cup_{i=1:n} A_i)}{P(A_{i1} \cap A_{i2} \dots \cap A_{ir})} = \sum_i P(A_i) - \sum_{i1 < i2} P(A_{i1} \cap A_{i2}) + \dots + (-1)^{r+1} \sum_{i1 < i2 < \dots < ir} P(A_{i1} \cap A_{i2} \dots \cap A_{ir})$$

Exercice: démonstration des propriétés

Lien avec l'analyse combinatoire

- ◆ Si les événements élémentaires de Ω sont équiprobables et en nombre fini $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N$ avec $P(\omega_i) = 1/N \forall i$, alors pour tout événement A la probabilité de A est égale à la proportion dans l'ensemble Ω des événements élémentaires contenus dans A :
 - ◆ $P(A) = \text{Card}(A)/\text{Card}(\Omega)$
- ◆ En clair cette définition possible de la probabilité ne s'applique qu'à des cas « simples »: dés, jeux de cartes,...

Exercice: Si n personnes sont présentes dans une pièce, quelle est la probabilité que leurs anniversaires tombent sur des jours tous différents? Quelle valeur faut-il donner à n pour que cette probabilité descende en dessous de $1/2$?

Exp matlab:

```
N=10000;
```

```
d1=randint(1,N,[1 6]);%d1 va contenir le résultat de 1000 lancers de dé
```

```
pd1=hist(d1,[1:6])/N;
```

```
figure;subplot(211);plot(d1);%trace les 1000 résultats
```

```
subplot(212);stem([1:6],pd1)%trace l'histogramme des résultats
```

```
%lancé d'un autre dé N fois
```

```
d2=randint(1,N,[1 6]);
```

```
pd2=hist(d2,[1:6])/N;
```

```
figure;subplot(211);plot(d2);%trace les 1000 résultats
```

```
subplot(212);stem([1:6],pd2)%trace l'histogramme des résultats
```

Probabilité conditionnelle et indépendance

21 - Probabilités, Pascale Jardin

Probabilité conditionnelle

- ◆ Souvent une partie de l'information concernant le résultat de l'expérience est disponible
- ◆ Même quand ce n'est pas le cas il peut être intéressant d'utiliser le « détour » de certaines probabilités conditionnelles pour calculer la probabilité d'un évènement
- ◆ Exemple: lancé de 2 dés :
 $\Omega = \{(i,j), i=1 \dots 6, j=1 \dots 6\}$
 - ◆ Quelle est la probabilité d'avoir la somme des 2 dés égale à 8 ?
 - ◆ Si on sait que le premier dé donne 3 quelle est la probabilité d'avoir la somme des 2 dés égale à 8?
 - ◆ Si on sait que la somme est égale à 8 quelle est la probabilité pour que le premier dé donne 3?

exp Matlab: (suite de la page 20):

```
s=d1+d2;%somme des deux résultats pour chacune des N expériences
i_s_egal_8=find(s==8);%indices du vecteur s pour lesquels la valeur est égale à 8
proba_s_egal_8=length(i_s_egal_8)/N
i_d1_egal_3=find(d1==3);
i_s_egal_8_si_d1_egal_3=find(s(i_d1_egal_3)==8);
proba_s_egal_8_si_d1_egal_3=length(i_s_egal_8_si_d1_egal_3)/length(i_d1_egal_3)
i_s_egal_8=find(s==8);
i_d1_egal_3_si_s_egal_8=find(d1(i_s_egal_8)==3);
proba_d1_egal_3_si_s_egal_8=length(i_d1_egal_3_si_s_egal_8)/length(i_s_egal_8)
```

Probabilité conditionnelle

- ◆ Soient A et B deux évènements pour une expérience. Si B est réalisé, l'ensemble des résultats possibles n'est plus Ω mais B (ensemble fondamental réduit).

Ω

- ◆ La probabilité de A est alors celle de l'évènement $A \cap B$ rapportée à la probabilité de B.
- ◆ On en déduit que: La probabilité $P(A/B)$ de A sachant que B est réalisé, appelée probabilité conditionnelle de A si B est donnée par:

- ◆ $P(A/B) = P(A \cap B) / P(B)$

- ◆ La probabilité conditionnelle satisfait les 3 axiomes de base d'une probabilité:
 - ◆ $P(A/B) \geq 0$
 - ◆ $P(\Omega/B) = 1$
 - ◆ $P(A \cup C/B) = P(A/B) + P(C/B)$ si $A \cap C = \emptyset$
- ◆ Théorème des probabilités composées
 - ◆ $P(A \cap B) = P(B) P(A/B) = P(A) P(B/A)$
 - ◆ Généralisation pour des évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$ quelconques:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2/A_1) P(A_3/A_1 \cap A_2) \dots P(A_n/A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$
- ◆ Formule (théorème) de Bayes
 - ◆ $P(A/B) = P(A)P(B/A) / P(B)$

Exercice: Mathieu hésite entre suivre un cours de maths et un cours d'électronique. Il préfère l'électronique mais il estime qu'il a une probabilité 1/2 d'avoir une note A en maths et 1/3 d'avoir une note A en électronique. Il prend sa décision en tirant à pile ou face.

Quelle est la probabilité qu'il obtienne A en électronique?

Théorème des probabilités totales Théorème de Bayes généralisé

- ◆ Si l'ensemble $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ est une partition de Ω alors (théorème des probabilités totales):

- ◆ $P(A) = \sum_{i=1:n} P(B_i)P(A/B_i)$

- ◆ On a alors (théorème de Bayes généralisé):

- $P(B_i/A) = P(B_i) P(A/B_i) / (\sum_{j=1:n} P(B_j)P(A/B_j))$

Exercice: dans une société de vente par téléphone, les vendeurs sont tellement occupés que seuls 60% des clients téléphonant pour la première fois obtiennent la communication avec l'un d'eux. On demande aux autres de laisser leur n° de téléphone. Trois fois sur quatre un vendeur trouve le temps de rappeler le jour même, autrement le rappel a lieu le lendemain. L'expérience a montré que la probabilité qu'un client potentiel passe effectivement commande est 0.8 s'il a pu parler directement avec un vendeur et que cette probabilité tombe à 0.5 et 0.3 respectivement s'il y a eu rappel du client le jour même ou le lendemain.

- a) Quel pourcentage de clients potentiels passent commande ?
- b) Quel pourcentage de ceux qui ont passé commande n'ont pas eu à attendre qu'on les rappelle?

Indépendance

- ◆ Si la probabilité conditionnelle de A si B est réalisé est égale à la probabilité de A, A est dit indépendant de B :
 - ◆ $P(A/B)=P(A)$
 - ◆ On a alors : $P(A \cap B)=P(B) P(A)$ qui implique que B est indépendant de A
- ◆ Deux évènements A et B sont indépendants (on note $A \perp B$) si et seul^t si:
 - ◆ $P(A \cap B)=P(B) P(A)$
- ◆ Propriétés: Si $A \perp B$
 - ◆ $A \perp B^c$
 - ◆ $A^c \perp B$
 - ◆ $A^c \perp B^c$

Indépendance totale de n évènements

- ◆ Un ensemble d'évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$ est dit totalement indépendant si pour tout sous ensemble $A_{1'}, A_{2'}, \dots, A_{r'}$ ($r \leq n$):
 - ◆ $P(A_{1'} \cap \dots \cap A_{r'}) = P(A_{1'}) \dots P(A_{r'})$
- ◆ Exemple: système à n composants en //
 - ◆ qui fonctionne si l'un des composants fonctionne
 - ◆ dont les n composants sont indépendants et fonctionnent avec une probabilité p_i ($i=1$ à n)
 - ◆ $P(\text{fonctionnement}) = 1 - \prod_i (1 - p_i)$

Variables aléatoires

28 - Probabilités, Pascale Jardin

Variables aléatoires

- ◆ Dans de nombreux cas on peut associer à un événement un nombre réel. On parle alors de variable aléatoire.
- ◆ Points abordés
 - ◆ Définition
 - ◆ Variable aléatoire discrète
 - ◆ Variable aléatoire continue
 - ◆ Loi de probabilité conditionnelle

Exemples de variables aléatoires:

Le résultat d'un lancé de dé

La taille des individus

Le nombre de communications sur un réseau téléphonique en une minute

Définitions

- ◆ Une variable aléatoire (v.a.) X est une application de Ω dans $\mathbb{R}$ telle qu'à tout ω de Ω correspond une valeur $X(\omega)=x$.
- ◆ L'ensemble $R_X \subset \mathbb{R}$ des valeurs possibles de X est appelé domaine de variation ou support de X
- ◆ Remarque
 - ◆ L'application n'est pas forcément bijective (elle est surjective)
 - ◆ exemple du lancé de dé: $R_X=\{1,2,3,4,5,6\}$ ou bien $R_X=\{-1,0,1\}$
- ◆ A tout sous-ensemble F de R_X correspond un évènement sur Ω : $E=X^{-1}(F)=\{\omega/ X(\omega)\in F\}$
- ◆ Cette correspondance permet de définir la loi de probabilité de la v.a. X :

$$P_X(F)=P(X^{-1}(F))=P(X\in F)$$

30 - Probabilités, Pascale Jardin

Exemple: jeu de fléchettes , variables aléatoires possibles:

-distance de la fléchette au centre de la cible

-coordonnées de la position de la fléchette

-nombres de lancers à effectuer avant d'atteindre le centre

Exp matlab: nombre de lancés avant d'avoir un 6

```
N=10000;%nombre d'expériences
```

```
nb_lances_pour_obtenir_6=ones(1,N);
```

```
for n=1:N
```

```
  d_different_de_6=1;
```

```
  while d_different_de_6
```

```
    d=randint(1,1,[1 6]);
```

```
    if d==6
```

```
      d_different_de_6=0;
```

```
    else
```

```
      nb_lances_pour_obtenir_6(n)=nb_lances_pour_obtenir_6(n)+1;
```

```
    end
```

```
  end
```

```
end
```

```
maxnb=max(nb_lances_pour_obtenir_6);%valeur maximale obtenue
```

```
pnb=hist(nb_lances_pour_obtenir_6,[1:maxnb])/N
```

```
figure;stem([1:maxnb],pnb)
```

- ◆ Dans de nombreux cas l'application de Ω dans R_x est « naturelle »
 - ◆ Température
 - ◆ Nombre d'appels téléphoniques sur une durée ...
- ◆ Dans d'autres cas il n'est pas évident de définir une variable aléatoire ayant du sens (respectant une notion d'ordre et de distance entre évènements)
 - ◆ Risque de défaillance d'un composant
 - ◆ Bases d'une séquence ADN

Variables aléatoires discrètes

32 - Probabilités, Pascale Jardin

- ◆ Lorsque R_X est un ensemble fini (de taille N) ou dénombrable $\{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, X est une v.a. discrète.
- ◆ La loi de probabilité de X est définie par l'ensemble $\{p_1, \dots, p_n, \dots\}$
 - ◆ $p_i = P(X^{-1}(x_i))$ (noté aussi $P(X=x_i)$ ou $p(x_i)$)
 - ◆ Propriétés:
 - ◆ $p_i \geq 0$
 - ◆ $\sum_{i=1:N} p_i = 1$
 - ◆ Démonstration: les $X^{-1}(x_i)$ forment une partition de Ω
- ◆ Pour tout $B \subset R_X$: $P_X(B) = \sum_{\{i, x_i \in B\}} p_i$

Exercice: on répète le jet d'une pièce jusqu'à ce que pile apparaisse mais au plus n fois. Les jets sont indépendants et pile apparaît avec la probabilité p . X désigne le nombre de jets réalisés jusqu'à l'arrêt de l'expérience.

- 1) Domaine de variation de X
- 2) Loi de probabilité de X
- 3) Exp Matlab: programmez cette expérience (avec $p=1/2$) en vous inspirant du script donné p 30

- ◆ Représentation sous forme d'histogramme

- ◆ Ex: somme de 2 dés
- ◆ $R_X = \{2, \dots, 12\}$

exp matlab : dans le script donné p 20 et 22 il suffit de rajouter :
`ps=hist(s,[2:12])/N;`
`figure;stem([2:12],ps)`

Espérance et variance

- ◆ Espérance $E(X)$ ou m
 - ◆ Moyenne statistique
 - ◆ Pour une v.a. discrète
$$E(X)=m=\sum_i p_i x_i$$
- ◆ Variance $\text{Var}(X)$ ou σ^2 :
 - ◆ Mesure la dispersion autour de la moyenne, c'est l'écart carré moyen à la moyenne
 - ◆ Pour une v.a. discrète
$$\text{Var}(X)=\sigma^2=\sum_i p_i (x_i - m)^2$$

Exp matlab:

La moyenne s'obtient par la fonction mean et l'écart type σ (racine carrée de la variance) s'obtient par la fonction std. Par exemple pour le nombre de lancers de dés nécessaire pour obtenir 6 (page 30) on peut obtenir ces grandeurs par les instructions suivantes:

```
M=mean(nb_lances_pour_obtenir_6)
```

```
sigma=std(nb_lances_pour_obtenir_6)
```

Lois discrètes les plus utilisées

36 - Probabilités, Pascale Jardin

Loi de Bernouilli : $X \sim Be(p)$

- ◆ $\Omega = \{A = \text{« réussite »}, A^* = \text{« échec »}\}$
 $R_X = \{1, 0\}$
- ◆ $P(X=1) = p$ et $P(X=0) = q = 1-p$
- ◆ Exemples:
 - ◆ Pile ou face
 - ◆ Examen de fin d'unité (avoir ou non la moyenne)
 - ◆ Transmission ou non sur un slot dans un réseau
- ◆ Moyenne et variance
 - ◆ $m = p$, $\sigma^2 = p(1-p)$

37 - Probabilités, Pascale Jardin

Exercice: montrer que $\sigma^2 = p(1-p)$. Pour quelle valeur de p cette variance est elle maximale?

Exp Matlab:

```
Nexp=1000;
```

```
p=0.1;
```

```
x=randsrc(Nexp,1,[0 1;1-p p]) ;
```

```
p_est=hist(x,[0:1])/Nexp;
```

```
stem([0:1],p_est)
```

```
M=mean(x)
```

```
Sigma=std(x)
```

Loi binomiale : $X \sim \text{Bi}(n,p)$

- ◆ Répétition (n fois) de l'épreuve de Bernouilli:
 - ◆ X : nombre de réussites parmi n épreuves indépendantes de Bernouilli de même loi (p)
 - ◆ v.a. à valeurs dans $R_X = \{0,1,2,\dots,n\}$
- ◆ Loi de probabilité d'une variable binomiale $\text{Bi}(n,p)$:
 - ◆ $p_i = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$ pour $i \in \{0,1,\dots,n\}$
- ◆ Moyenne: $m=np$
- ◆ Variance: $\sigma^2 = np(1-p)$

38 - Probabilités, Pascale Jardin

Toute séquence comportant i succès et $n-i$ échecs est de probabilité $p^i(1-p)^{n-i}$ car les épreuves sont indépendantes.

Il y a C_n^i séquences (parmi les 2^n séquences de n valeurs 0 ou 1 possibles) qui comporte i succès.

Exercice: démontrer que $m=np$ et que $\sigma^2 = np(1-p)$

Exercice: roue de la fortune

Un joueur parie sur un numéro entre 1 et 6. On jette ensuite 3 dés. Si le nombre choisi par le joueur apparaît i fois ($i=1,2,3$) celui-ci gagne i euros, sinon il perd 1 euro. Ce jeu est-il honnête?

Exp Matlab:

```
Nexp=10000;
n=100;
p=0.1;
x_ber=randsrc(Nexp,n,[0 1;1-p p]);
x_bin=sum(x_ber,2);
p_est=hist(x_bin,[0:n])/Nexp;
stem([0:n],p_est)
M=mean(x_bin)
Sigma=std(x_bin)
```

Histogrammes pour la loi Binomiale

- ◆ Lorsque k croît de 0 à n , p_k croît puis décroît le pic étant atteint pour $k = \lfloor (n+1)p \rfloor$
- ◆ Histogrammes pour $n=100$
 - ◆ $p=0.1$
 - ◆ $p=0.5$
 - ◆ $p=0.9$

Exercice: Faire le rapport p_{k+1}/p_k

Loi géométrique

- ◆ Répétition de l'épreuve de Bernoulli
- ◆ X est le nombre d'épreuves nécessaires pour obtenir un premier succès: $R_X = \mathbb{N}^*$
- ◆ $p_i = p(1-p)^{i-1}$ pour $i=1, 2, \dots$
- ◆ Histogramme (pour $p=0.1$)

Exercice: montrer que $\sum p_i = 1$

Exp matlab: l'expérience proposée p 30 (nb de lancés d'un dé pour obtenir 6) correspond à une loi géométrique de paramètre $p=1/6$

Loi de Poisson : $X \sim \text{Po}(\mu)$

- ◆ v.a: comptage d'évènements rares indépendants sur un espace ou une durée fixée.
- ◆ $p_i = (\mu)^i \exp(-\mu) / i!$ pour $i \in \mathbb{N}$
- ◆ μ (sans dimension) représente le produit d'une intensité λ et d'une grandeur physique (longueur, surface, volume ou intervalle de temps)
 - ◆ Ex sur le temps : nombre d'accidents de circulation mortels par jour $\mu = \lambda t$
 - ◆ Ex sur une longueur : nombre de défauts le long d'un câble en acier

41 - Probabilités, Pascale Jardin

Loi de Poisson: exemples: décompte des appels sur un central téléphonique, comptage des voitures à un péage. C'est la loi la plus utilisée dans les études sur les files d'attente dans les réseaux de communication. Le paramètre λ caractérise le débit moyen du flux sur la durée fixée.

Exercice: le nombre d'éruptions dangereuses du Vésuve suit une loi de Poisson: $X \sim \text{Po}(\lambda t)$ avec $\lambda = 0.0003$ (l'unité de temps étant l'année)

Quelle est la probabilité d'observer au moins une éruption durant :

- le siècle à venir
- le millénaire à venir

Exp Matlab:

```
N=10000;
mu=1;
x_poisson = poissrnd(mu,[1 N]);
x_max=max(x_poisson);
p_poisson = hist(x_poisson,[0:x_max])/N;
stem([0:x_max],p_poisson)
```

- ◆ Moyenne: $m = \mu$
- ◆ Variance: $\sigma^2 = \mu$
- ◆ Histogrammes de la loi de Poisson

Exercice: montrer que $m = \mu$ et $\sigma^2 = \mu$

Approximation de la loi binomiale

- ◆ La loi de Poisson est une approximation de la loi binomiale lorsque n est grand et p petit
- ◆ Si $X \sim \text{Bi}(n,p)$ avec p faible et np fini
 $X \sim \text{Po}(np)$
- ◆ Histogrammes

43 - Probabilités, Pascale Jardin

Exercice: démontrer cette propriété

Exercice: dans une société de 150 personnes si on estime à 0.01 la probabilité qu'un employé soit absent de manière ponctuelle et imprévisible, quelle est la probabilité qu'il y ait 1, 2, 3 personne(s) absente(s) un jour donné ?

Variable aléatoire continue

44 - Probabilités, Pascale Jardin

Variable aléatoire continue

- ◆ Le domaine de variation de X est $R_X \subset \mathbb{R}$
 - ◆ Parce que le nombre de valeurs possibles est très grand dans un intervalle limité
 - ◆ Parce que la v.a. est de nature continue (par exemple la pression, la température,...)
- ◆ Conséquence: si il y a une infinité non dénombrable de valeurs possibles de la v.a. X
 $p(x) = P(X=x)=0$ pour tout x de R_X

Remarque: La distinction v.a. discrète et v.a. continue n'est pas toujours pertinente

-En pratique la précision des appareils de mesure limite le nombre de valeurs possibles même pour les processus de nature continue

-Au fur et à mesure que le nombre de valeurs possibles augmente on a tendance à approximer la loi discrète par une loi continue

Exemple: taille des individus

Au cm près

Au mm près

Au micron près

Au nanomètre près

Fonction de répartition

- ◆ C'est la fonction qui associe à chaque valeur x de la v.a. X la probabilité de ne pas excéder cette valeur : $F(x)=P(X\leq x)$
- ◆ Propriétés:
 - ◆ F est croissante: si $x < y$ $F(x) \leq F(y)$
 - ◆ $P(x < X \leq y) = F(y) - F(x)$
 - ◆ F est continue sur $\mathbb{R}$

Fonction de densité de probabilité

- ◆ On appelle fonction de densité de probabilité la fonction $f(x)$ telle que:

- ◆
$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X \leq x + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$

- ◆
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

- ◆ Propriétés

- ◆ $f(x) \geq 0$

- ◆ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

- ◆ $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$

Espérance et variance pour une v.a. continue

- ◆ Espérance mathématique ou moyenne statistique

- ◆
$$E(X) = m_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

- ◆ Variance (dispersion autour de la moyenne):

- ◆
$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = E\left((X - m_X)^2\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_X)^2 f(x) dx$$

- ◆ Écart-type: σ_X

Inégalités

- ◆ Inégalité de Markov
 - ◆ Valable si $f(x)=0$ (ou $p(x)=0$) $\forall x < 0$
 - ◆ $P(X \geq a) \leq E(X)/a \quad \forall a > 0$

- ◆ Inégalité de Chebyshev
 - ◆ Valable pour toute v.a. X
 - ◆ $P(|X - m_X| \geq a) \leq \text{Var}(X)/a^2$
 - ◆ En particulier:
 - ◆ $P(|X - m_X| \geq n\sigma_X) \leq 1/n^2$

L'inégalité de Chebyshev donne une borne « lâche » majorant la probabilité d'avoir une valeur éloignée de la moyenne.

Ex: $p(|X - m| > 2\sigma) < 1/4$: « au moins les $3/4$ des valeurs de X se trouvent entre $m - 2\sigma$ et $m + 2\sigma$ »

Fonctions de densité les plus utilisées

- ◆ **Loi uniforme** sur un intervalle : $X \sim \text{Un}(a,b)$
 - ◆ $f(x)=1/(b-a)$ pour $x \in [a,b]$ (et =0 ailleurs)

- ◆ Ex: bruit de quantification: $Q \sim \text{Un}(-q/2, q/2)$

Exercice: probabilité d'attendre le métro (plus de 30s, plus de 3mn) s'il y en a un toutes les 5mn

Exercice: déterminer la moyenne et la variance d'une v.a. uniforme

◆ **Loi exponentielle:** $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

- ◆ $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ ($=0$ pour $x < 0$)
- ◆ $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ ($=0$ pour $x < 0$)

- ◆ La loi exponentielle modélise bien le temps séparant deux évènements consécutifs dans la théorie des files d'attente.

Exercice: on admet que dans la théorie des files d'attente, le nombre Y d'occurrences d'un évènement sur un intervalle de temps suit une loi de Poisson $Y \sim \text{Po}(\lambda)$. Montrer alors que le temps X séparant deux évènements consécutifs suit une loi exponentielle.

Exercice: Montrer que la moyenne vaut $1/\lambda$ et la variance vaut $1/\lambda^2$ (utiliser l'intégration par parties)

Loi Normale (ou de Gauss)

- ◆ Loi très importante en raison du théorème central limite exprimé de façon simplifiée par:
 - ◆ Si une v.a. X est la somme de n v.a. indép^{tes} $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ de même loi, alors la loi de X tend vers une loi normale quand n grand ($n \sim 50$ suffit)
- ◆ Loi Normale : $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$
 - ◆ $f(x) = 1/(2\pi\sigma^2)^{1/2} \exp(-(x-m)^2/2\sigma^2)$
- ◆ Moyenne et variance:

- ◆ $E(X) = m$

- ◆ $\text{Var}(X) = \sigma^2$

53 - Probabilités, Pascale Jardin

Commentaires:

-pas de primitive pour $f(x)$ donc pas de formule analytique pour $F(x)$

-F tabulée pour la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$ et si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $Z = (X-m)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$

Loi de probabilité conditionnelle

- ◆ Si on définit un événement A tel que $P(A) \neq 0$, la fonction de répartition conditionnelle $F(x/A)$ est définie par:
 - ◆ $F(x/A) = P(X \leq x/A) = P((X \leq x) \cap A) / P(A)$
- ◆ Pour X v.a. discrète:
 - ◆ $p(x/A) = P((X=x) \cap A) / P(A)$
- ◆ Pour X v.a. continue:
 - ◆ $f(x/A) = dF(x/A)/dx = P((x < X \leq x+dx) \cap A) / P(A) / dx$
 $= f(x)P(A/x) / P(A)$
 - ◆ avec la notation $P(A/x) = P(A / x < X \leq x+dx)$

$p(x/A)$ est une loi de probabilité et $f(x/A)$ est une densité de probabilité
On peut définir leur moyenne, leur variance

◆ Théorème de Bayes

◆ $P(A/x)=P(A)f(x/A)/f(x)$

◆ Théorème des probabilités totales

◆ $P(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)P(A/x) dx$

◆ Théorème de Bayes généralisé (version continue)

◆ $f(x/A) = \frac{f(x)P(A/x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)P(A/x) dx}$

Cas où A est défini par rapport à X $A \equiv (a < X < b)$

- ◆ $F(x / (a < X < b)) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ (F(x) - F(a)) / (F(b) - F(a)) & \text{si } a < x < b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$
- ◆ $p(x / (a < X < b)) = \begin{cases} p(x) / (F(b) - F(a)) & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{autrement} \end{cases}$
- ◆ $f(x / (a < X < b)) = \begin{cases} f(x) / (F(b) - F(a)) & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{autrement} \end{cases}$
- ◆ Exemple: loi de Gauss $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ avec
 $A = (m < X < m + \sigma)$

Cas où A est défini par rapport à une autre loi que celle de X

- ◆ théorème des probabilités totales:
 - ◆ N hypothèses A_i formant une partition.
 $F(x) = \sum_{i=1:n} P(A_i) F(x/A_i)$
 - ◆ pour une v.a. discrète:
 - ◆ $p(x) = \sum_{i=1:n} P(A_i) p(x/A_i)$
 - ◆ pour une v.a. continue:
 - ◆ $f(x) = \sum_{i=1:n} P(A_i) f(x/A_i)$

Fonction d'une variable aléatoire

58 - Probabilités, Pascale Jardin

Y=h(X) avec h strictement monotone

◆ Cas discret: $P(Y=y)=P(h(X)=y)=P(X=h^{-1}(y))$

◆ Cas continu: $F_Y(y) = \begin{cases} F_X(h^{-1}(y)) & \text{si } h \uparrow \\ 1 - F_X(h^{-1}(y)) & \text{si } h \downarrow \end{cases}$

◆ Si la fonction h^{-1} est dérivable

◆
$$f_Y(y) = f_X(h^{-1}(y)) \left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right|$$

◆ Cas particulier: $Y=aX+b$

◆
$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \left| \frac{1}{a} \right|$$

Il est courant que la v.a. d'intérêt ne soit pas directement observable (ou mesurable) mais que la variable observable soit liée à celle qui nous intéresse par l'intermédiaire d'une fonction connue. Le problème est de trouver la loi de la v.a. d'intérêt connaissant celle de la variable observable.

Espérance et Variance de $Y=h(X)$

◆ Espérance: $E(Y)=E(h(X))$

◆ Cas discret

$$E(Y) = \sum_i h(x_i) p_i$$

◆ Cas continu

$$E(Y) = \int h(x) f(x) dx$$

◆ Variance: $\text{Var}(Y)=\text{Var}(h(X))$

◆ $\text{Var}(Y)=E(h^2(X)) - E^2(h(X))$

Exercice: Information $Y=\log(1/p(X))$. Calcul de l'entropie qui est l'information moyenne

Couples aléatoires

61 - Probabilités, Pascale Jardin

Intérêt

- ◆ Il est courant que l'on ait à étudier deux variables aléatoires liées entre elles
 - ◆ Position (X, Y) aléatoire
 - ◆ Entrée $X \rightarrow$ Sortie Y d'un canal de transmission
 - ◆ Variable aléatoire dépendant du temps (processus aléatoire) X_t , on s'intéresse au lien entre les v.a. à deux instants différents $(X_t, X_{t'})$
- ◆ L'étude est généralisable au cas d'un nombre quelconque de v.a.
 - ◆ Vecteur aléatoire $\underline{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$

Domaine de variation conjoint – Fonction de répartition

- ◆ Domaine de variation R_{XY} d'un couple aléatoire (X, Y) : ensemble des couples (x, y) de valeurs possibles
 - ◆ $R_{XY} \subset R_X \times R_Y$
- ◆ Fonction de répartition
 - ◆ $F(x, y) = P(X \leq x \cap Y \leq y)$
 - ◆ Fonction croissante entre 0 et 1

63 - Probabilités, Pascale Jardin

Exercice: domaine de variation R_{XY} pour X et Y à valeurs dans $R_X = R_Y = \{0, 1, \dots, N\}$ sous deux contraintes:

- $X + Y \leq N$ (ex: famille de 4 enfants au plus, $N=4$, X nb de filles, Y nb de garçons)

- $Y \leq X$ (ex: 2 tris successifs)

Fonction de (densité de) probabilité

- ◆ Pour un couple discret la fonction de probabilité conjointe est donnée par:
 - ◆ $p(x,y) = \begin{cases} P(X=x \cap Y=y) & \text{si } (x,y) \in R_{XY} \\ 0 & \text{si } (x,y) \notin R_{XY} \end{cases}$
- ◆ Pour un couple continu la fonction de densité de probabilité conjointe $f(x,y)$ est donnée par:
 - ◆ $f(x,y) = \partial^2 F(x,y) / \partial x \partial y$

Fonctions de (densités de) probabilité marginales

- ◆ On peut obtenir les fonctions de (densités de) probabilité de chacune des variables X et Y , connaissant la loi (densité) conjointe du couple (X, Y) (l'inverse n'est pas vrai)
- ◆ Cas discret: fonctions marginales
 - ◆ $p_X(x) = \sum_j p(x, y_j)$ $p_Y(y) = \sum_i p(x_i, y)$
- ◆ Cas continu: fonctions de densités marginales
 - ◆ $f_X(x) = \int_{-\infty; +\infty} f(x, y) dy$ $f_Y(y) = \int_{-\infty; +\infty} f(x, y) dx$

◆ Ex:

65 - Probabilités, Pascale Jardin

Exercice: $f(x, y) = 2(x + y - 2xy)$ sur $[0, 1] \times [0, 1]$ et 0 ailleurs. Déterminer les marginales $f(x)$ et $f(y)$

Covariance - corrélation

- ◆ Si m_X et m_Y sont les espérances respectives de X et Y , on définit la covariance de X et Y $\sigma_{XY} = \text{cov}(X, Y)$ par: $\sigma_{XY} = E((X - m_X)(Y - m_Y))$
- ◆ Cas discret
 - ◆ $\sigma_{XY} = \sum_i \sum_j (x_i - m_X)(y_j - m_Y)p(x_i, y_j)$
- ◆ Cas continu
 - ◆ $\sigma_{XY} = \int_{-\infty; +\infty} \int_{-\infty; +\infty} (x - m_X)(y - m_Y)f(x, y) dx dy$
- ◆ Le coefficient de corrélation ρ_{XY} est défini par:
 - ◆ $\rho_{XY} = \sigma_{XY} / (\sigma_X \sigma_Y) \Rightarrow -1 \leq \rho_{XY} \leq 1$

Exercice: Matrice de covariance

Exercice: $Y = aX + b \Rightarrow \rho_{XY} = \pm 1$

Distributions Conditionnelles

- ◆ C'est l'un des intérêts majeurs de considérer des couples de v.a. , on peut obtenir des informations sur l'une lorsque des informations sont disponibles sur l'autre en exploitant le lien entre les deux.
- ◆ Cas discret
 - ◆ $p_X(x/y)=p(x,y)/p_Y(y)$ $p_Y(y/x)=p(x,y)/p_X(x)$
- ◆ Cas continu
 - ◆ $f_X(x/y)=f(x,y)/f_Y(y)$ $f_Y(y/x)=f(x,y)/f_X(x)$

- ◆ Théorème des probabilités composées
 - ◆ Cas discret: $p(x,y)=p_X(x/y)p_Y(y)=p_X(x)p_Y(y/x)$
 - ◆ Cas continu: $f(x,y)=f_X(x/y)f_Y(y)=f_X(x)f_Y(y/x)$
- ◆ Théorème des probabilités totales
 - ◆ Cas continu
 - ◆ $f_X(x)=\int_{-\infty;+\infty} f_X(x/y)f_Y(y) dy$
 - ◆ $f_Y(y)=\int_{-\infty;+\infty} f_X(x)f_Y(y/x) dx$
- ◆ Théorème de Bayes
 - ◆ Cas discret
 - ◆ $p_X(x/y)=\frac{p_X(x)p_Y(y/x)}{\sum_i p_X(x_i)p_Y(y/x_i)}$

Exercice: écrire le théorème des probabilités totales dans le cas discret et le théorème de Bayes dans le cas continu.

Exercice: canal binaire symétrique : calcul de la distribution de probabilité de la sortie Y

Espérance et variance conditionnelle

- ◆ Espérance $m_{X/Y} = E(X/y)$
 - ◆ Cas discret: $m_{X/Y} = \sum_i x_i p_X(x_i/y)$
 - ◆ Cas continu: $m_{X/Y} = \int_{-\infty; +\infty} x f_X(x/y) dx$
- ◆ Variance $\sigma^2_{X/Y} = \text{Var}(X/y)$
 - ◆ Cas discret: $\sigma^2_{X/Y} = \sum_i (x_i - m_{X/Y})^2 p_X(x_i/y)$
 - ◆ Cas continu: $\sigma^2_{X/Y} = \int_{-\infty; +\infty} (x - m_{X/Y})^2 f_X(x/y) dx$
- ◆ Lien entre espérance et espérance conditionnelle
 - ◆ $E(X) = \begin{cases} \sum_j E(X/y_j) p_Y(y_j) & \text{pour } Y \text{ discrète} \\ \int_{-\infty; +\infty} E(X/y) f_Y(y) dy & \text{pour } Y \text{ continue} \end{cases}$

Exercice: montrer que pour deux v.a. X et Y indépendantes:

$$E(X/y) = E(X) \text{ et } E(Y/x) = E(Y)$$

Indépendance

- ◆ Deux v.a. X et Y sont indépendantes (on note $X \perp Y$) si la connaissance de l'une ne modifie pas la distribution de probabilité de l'autre
- ◆ Cas discret:
 - ◆ $X \perp Y \Leftrightarrow \begin{cases} p_X(x/y)=p_X(x) \quad \forall x \\ p_Y(y/x)=p_Y(y) \quad \forall y \end{cases}$
 $\Leftrightarrow p(x,y)=p_X(x) p_Y(y) \quad \forall x,y$
- ◆ Cas continu:
 - ◆ $X \perp Y \Leftrightarrow \begin{cases} f_X(x/y)=f_X(x) \quad \forall x \\ f_Y(y/x)=f_Y(y) \quad \forall y \end{cases}$
 $\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x) f_Y(y) \quad \forall x,y$
- ◆ Propriété: Pour deux v.a. X et Y indépendantes: $\sigma_{XY}=0$

Exercice: X et Y sont les durées de vie des deux machines qui suivent des lois exponentielles X et $Y \sim \text{Exp}(0.01)$ en heures . Quelle est la probabilité de panne ($X+Y < 10$) avec ces 2 machines ?

Exercice: montrer la propriété: Pour deux v.a. X et Y indépendantes: $\sigma_{XY}=0$

Somme de deux variables aléatoires indépendantes

- ◆ On considère $Z=X+Y$ avec $X \perp Y$
- ◆ La variance de la somme est la somme des variances
 - ◆ $\sigma_Z^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$
- ◆ La distribution de probabilité de la somme est le produit de convolution des distributions
 - ◆ Cas discret
 - ◆ $p_Z(z) = \sum_i p_X(x_i)p_Y(z-x_i) = \sum_j p_Y(y_j)p_X(z-y_j)$
 - ◆ Cas continu
 - ◆ $f_Z(z) = \int_{-\infty;+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_{-\infty;+\infty} f_Y(y)f_X(z-y)dy$

Exercice: démonstration des propriétés

Exercice: X et Y uniformes sur $[-1,1]$: loi de $Z=X+Y$?

Exercice: X v.a. à valeurs dans $\{-1,1\}$ Y v.a. continue normale $Y \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$: loi de $Z=X+Y$?

Génération de nombres aléatoires

72 - Probabilités, Pascale Jardin

Intérêt

- ◆ Il est toujours possible de générer une séquence aléatoire à partir de réalisations d'une expérience aléatoire mais c'est laborieux (lancer un dé 10000 fois, compter le nombre de voitures passant à un péage par minute pendant 1h déterminée pendant 10 jours...).
- ◆ On recherche une méthode arithmétique qui puisse faire cette génération automatiquement. La séquence sera alors pseudo- aléatoire (elle aura les mêmes caractéristiques qu'une séquence vraiment aléatoire tout en ayant été générée par des opérations déterministes)

Générateur aléatoire uniforme

- ◆ Algorithme classique : formule de Lehmer
 - ◆ $x_{i+1} = a x_i \text{ mod } b$ pour $i=0,1,\dots,n-1$
- avec $b \in \mathbb{N}^+$, $a \in \{1,2,\dots,b-1\}$ et $x_0 \in \{1,2,\dots,b-1\}$
- ◆ Sous certaines conditions sur a et b les valeurs x_i sont des réalisations d'une v.a. uniforme sur l'ensemble $\{0,1,2,\dots,b-1\}$
 - ◆ De bons résultats sont obtenus par exemple avec $a=2^7 - 1$ et $b=2^{31}-1$
 - ◆ En général on préfère générer des nombres uniformément répartis sur $[0,1[$ en effectuant la transformation: $y_i = x_i/b$

Génération suivant loi non uniforme par inversion de la fonction de répartition

- ◆ On génère des réalisations x_i d'une v.a. X de loi uniforme: $X \sim \text{Un}(0,1)$
- ◆ On considère une v.a. Y de fonction de répartition $F_Y(y)$.
- ◆ On applique l'inversion : $y_i = F_Y^{-1}(x_i)$.
- ◆ Les y_i sont des réalisations de la v.a Y

Génération suivant une loi discrète de distribution $P(X=x_i)=p_i$ pour $i=1,\dots,N$

- ◆ Division de l'intervalle $[0,1[$ en sous intervalles de longueur p_i .

- ◆ Génération de réalisations u_n d'une v.a. U de loi uniforme: $U \sim Un(0,1)$.
- ◆ lorsque $u_n \in [\sum_{k=0:i-1} p_k, \sum_{k=0:i} p_k[$ on génère x_i

Statistique descriptive – Estimation Introduction

77 - Probabilités, Pascale Jardin

Objectifs

- ◆ A partir d'un ensemble de N réalisations X_i (issues de mesures ou de simulation) d'une ou plusieurs v.a. (vecteur aléatoire) on cherche à décrire cette v.a. (ou ce vecteur)
 - ◆ En Statistique cet ensemble est appelé "échantillon représentatif" et la variable ou le vecteur aléatoire caractérise une "population"
 - ◆ Exemples:
 - ◆ taille, poids, âge des étudiants de l'ESIEE
 - ◆ PIB, taux de natalité, taux de mortalité, espérance de vie, revenu moyen des pays d'un continent
 - ◆ Activité des noeuds d'un réseau de communication

Statistiques courantes pour $X=(X_1,\dots,X_N)$

◆ $\text{Min}(X)=X_{(1)}$, $\text{Max}(X)=X_{(N)}$, étendue= $X_{(N)} - X_{(1)}$

◆ Moyenne:
$$\hat{m} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

◆ Variance:
$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \hat{m})^2$$

Histogramme

- ◆ L'histogramme est la représentation graphique des valeurs H_k en ordonnée (et x_k en abscisse) telles que :

- ◆ $H_k = \text{card}\{x_k < X_i < x_{k+1}\}$ pour $k=1$ à K
- ◆ avec $x_k = \text{Min} + (k-1)\Delta x$ et $\Delta x = (\text{Max} - \text{Min})/K$

Histogramme pour $N=10000$ réalisations d'une v.a. $\sim N(0,1)$, $K=20$

- ◆ l'histogramme permet l'estimation des probabilités

Estimation des probabilités

$$\diamond \hat{P}(a < X \leq b) = \frac{\text{card} \{a < X_i \leq b\}}{N}$$

$$\diamond \hat{F}(x) = \frac{\text{card} \{X_i \leq x\}}{N}$$

$$\diamond \hat{p}(x) = \frac{\text{card} \{X_i = x\}}{N}$$

$$\diamond \hat{f}(x) = \frac{\text{card} \left\{ x - \frac{\Delta x}{2} < X_i \leq x + \frac{\Delta x}{2} \right\}}{N \Delta x}$$

Estimation des paramètres de différentes lois à partir de l'estimée de la moyenne

- ◆ $X \sim \text{Bi}(n, p) : \hat{p} = \frac{\hat{m}}{n}$
- ◆ $X \sim \text{Ge}(p) : \hat{p} = \frac{1}{\hat{m}}$
- ◆ $X \sim \text{Po}(\mu) : \hat{\mu} = \hat{m}$
- ◆ $X \sim \text{Exp}(\lambda) : \hat{\lambda} = \frac{1}{\hat{m}}$

Qualités d'un estimateur

- ◆ Biais : $b(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$
 - ◆ On cherchera à avoir des estimateurs non biaisés
- ◆ EQM: $EQM(\hat{\theta}) = E\left((\hat{\theta} - \theta)^2\right)$
 - ◆ L'estimateur est efficient si son EQM est finie et minimale
- ◆ Consistance: un estimateur est consistant si: $\lim_{N \rightarrow \infty} P\left(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\right) = 1$

Exercice: Biais pour estimateur de la moyenne et de la variance